



Injektion med binyrebarkhormon

Injektion med binyrebark-hormon

Binyrebark-hormon dæmper den sygdomsaktivitet, der ses ved visse muskel- og ledsygdomme.

Injektion med binyrebark-hormon kan gives i led, muskler eller omkring sener. Er injektionen givet i eller omkring et led, er der størst effekt, hvis du ikke overbelaster det pågældende led de første 1-2 dage.

Alvorlige men sjældne bivirkninger

Infektion (betændelse med bakterier).

Ved mindre end 1 ud af 10.000 injektioner opstår der infektion. Infektionen vil typisk vise sig ved tiltagende rødme, varme, hævelse og smerte omkring leddet/injektionsstedet samt evt. feber.

Får du mistanke om infektion skal du henvende dig til:

- ambulatoriet (hverdage dagtid)
- eller egen læge/vagtlæge.

Mindre alvorlige bivirkninger

- Forbigående smerter ved injektionsstedet, typisk 12-24 timer efter indsprøjtningen.
- Søvnløshed og indre uro de første par døgn efter injektionen.
- Blussen i ansigtet, svedeture og/eller hjertebanken, hvilket er harmløst og fortager sig hurtigt.
- Hvidlig farvning af hud og fordybning af huden. Dette ses sjældent og skyldes svind af fedtvævet i underhuden.
- Enkelte kvinder oplever blødningsforstyrrelser.

Sukkersyge

Hvis du har sukkersyge vil der ofte komme forbigående stigning i dit blodsukker afhængig af typen af sukkersyge og mængden af indgivet binyrebark-hormon.

Ved insulinkrævende sukkersyge vil der ofte være behov for ekstra målinger af dit blodsukker og eventuelt ekstra insulin i en periode efter indsprøjtningen.

DANBIO styregruppe
Januar 2013