



## PATIENTINFORMATION

# MEDICIN: ABATACEPT

### Hvordan anvendes abatacept?

Abatacept anvendes ved behandling af leddegigt (reumatoid artrit).

### Hvordan virker abatacept?

Abatacept hæmmer aktiveringen af en bestemt type hvide blodlegemer, der har betydning for sygdomsudviklingen ved leddegigt. Virkningen består i, at leddenes hævelse, ømhed, stivhed og smerter aftager eller helt forsvinder. Varige skader på leddene påvirkes ikke, men medicinen er i stand til at forsinke eller helt forhindre yderligere ødelæggelse af leddene.

Virkningen af abatacept indtræder efter få måneder, og stoffet er virksomt hos mere end halvdelen. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 4-6 måneder standses behandlingen og erstattes af en anden. Virker abatacept godt, kan behandlingen videreføres i flere år.

### Hvordan gives abatacept?

Abatacept kan tages som indsprøjtning i underhuden en gang om ugen eller gives i blodåren med drop.

Gives abatacept i blodåren med drop gentages behandlingen 2 og 4 uger efter første dosis, og de efterfølgende behandlinger gives derpå hver 4. uge. Behandlingen varer ½ time, efterfulgt af kort tids observation.

### Abatacept og anden medicin

Abatacept anvendes sædvanligvis samtidig med methotrexate eller anden immundæmpende medicin. Der er ikke problemer med samtidig indtagelse af anden medicin.

### Bivirkninger ved Abatacept

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er hovedpine, øvre luftvejsinfektioner og kvalme. Infektioner kan udvikles hurtigere med sparsomme symptomer, hvorfor du i tilfælde af feber eller andre tegn på infektion skal kontakte lægen straks. Bivirkninger relateret til infusionen er sjældne.

Risikoen for eventuelle langtidsbivirkninger er endnu ikke endeligt afklaret. Der har været rejst mistanke om at behandlingen kan medføre øget risiko for udviklingen af visse kræftformer eller fremme udvikling af allerede eksisterende kræftsygdom. En sådan lille risiko kan ikke udelukkes, men afventer endelig afklaring.

### Forholdsregler ved planlagte operationer

På grund af risiko for infektion bør du informere den læge, der står for din behandling om den planlagte operation, således at I i fællesskab kan finde frem til den bedst egnede behandling omkring operationstidspunktet.

#### DANBIO



# DANBIO

DANSK REUMATOLOGISK DATABASE

Får du abatacept som infusion i blodåren med drop, bør sidste infusion være givet mindst 4 uger før operationen.

Hvis du selv indsprøjter abatacept i underhuden en gang om ugen, bør sidste indsprøjtning tages mindst 1 uge før operationen.

Behandlingen kan genoptages efter veloverstået operation når evt. sting er fjernet og der ikke er tegn på mangelfuld sårheling eller infektion.

## **Svangerskabsforebyggelse, amning og graviditet**

Både kvinder og mænd, der er i behandling med abatacept skal anvende svangerskabsforebyggende midler. Behandling med abatacept skal ophøre mindst 3 mdr. før planlagt graviditet.

Abatacept bør ikke anvendes under amning

## **Alkohol**

Under behandlingen er der ingen specielle forholdsregler vedrørende indtagelse af alkohol.

## **Kontrol**

Behandlingen fordrer ikke speciel blodprøvekontrol. Af hensyn til anden samtidig medicinsk behandling kontrolleres blodprøver hver 4.- 8. uge. I forbindelse med behandlingerne vurderes om abatacept har den ønskede effekt og der udspørges om eventuelle bivirkninger.

DANBIO styregruppe  
Juli 2014

### **DANBIO**

Glostrup Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR  
Indgang 5, stuen, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup | Tlf: 3863 3103  
Mail: [databasen@danbio-online.dk](mailto:databasen@danbio-online.dk) | Web: [www.danbio-online.dk](http://www.danbio-online.dk)