



PATIENTINFORMATION

MEDICIN: CERTOLIZUMAB PEGOL

Hvordan anvendes certolizumab pegol?

Certolizumab pegol anvendes ved behandling af leddegigt (reumatoid artrit).

Hvordan virker certolizumab pegol?

Certolizumab pegol hæmmer det betændelsesfremmende stof TNF- α (tumor necrosis factor α), der spiller en central rolle i sygdomsudviklingen. Virkningen består i, at leddenes hævelse, ømhed, stivhed og smerter aftager eller helt forsvinder. Varige skader på leddene påvirkes ikke, men medicinen er i stand til at forsinke eller helt forhindre yderligere ødelæggelse af leddene.

Virkningen af certolizumab pegol indtræder efter få uger, og stoffet er virksomt hos mere end halvdelen. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 3 måneder standses behandlingen og erstattes af en anden. Virker certolizumab pegol godt, kan behandlingen fortsætte i flere år.

Hvordan tages Certolizumab pegol?

Certolizumab pegol indsprøjtes under huden hver anden uge.

Hvis en dosis glemmes, skal den glemte dosis tages hurtigst muligt, og behandlingen fortsætte hver 2. uge som oprindeligt planlagt.

Certolizumab pegol opbevares i køleskab (2-8° C) og fragtes i køletaske.

Certolizumab pegol og anden medicin

Certolizumab pegol kan anvendes alene eller samtidig med methotrexat eller anden immundæmpende medicin.

Der er ikke problemer med samtidig indtagelse af anden medicin.

Bivirkninger ved Certolizumab pegol

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er infektioner og hovedpine. Infektioner kan udvikles hurtigere med sparsomme symptomer, hvorfor du i tilfælde af feber eller andre tegn på infektion skal kontakte lægen straks.

En meget almindelig bivirkning er reaktioner på indstiksstedet i form af rødme og kløe.

Risikoen for eventuelle langtidsbivirkninger er endnu ikke endeligt afklaret. Der har været rejst mistanke om at behandling med TNF α -hæmmere kan medføre øget risiko for udviklingen af visse kræftformer, herunder lymfekræft samt hudkræft. En sådan lille risiko kan ikke udelukkes, men afventer endelig afklaring.



DANBIO

DANSK REUMATOLOGISK DATABASE

Forholdsregler ved planlagte operationer

På grund af risiko for infektion anbefales, at sidste certolizumab pegol-sprøjte tages 2 uger før større operationer. Du skal derfor informere den læge, der står for din behandling om eventuelt planlagte operationer, således at I i fællesskab kan finde frem til den bedst egnede behandling omkring operationstidspunktet.

Behandlingen kan genoptages efter veloverstået operation når evt. sting er fjernet og der ikke er tegn på mangelfuld sårheling eller infektion.

Svangerskabsforebyggelse, amning og graviditet

Kvinder der er i behandling med certolizumab pegol skal anvende svangerskabsforebyggende midler. Behandling med certolizumab pegol skal ophøre mindst 5 mdr. før planlagt graviditet. Certolizumab pegol bør ikke anvendes under amning.

Alkohol

Under behandlingen er der ingen specielle forholdsregler vedrørende indtagelse af alkohol.

Kontrol

Behandlingen fordrer ikke speciel blodprøvekontrol. Af hensyn til anden samtidig medicinsk behandling kontrolleres blodprøver hver 4.-8. uge. I forbindelse med kontrolbesøg vurderes om certolizumab pegol har den ønskede virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger.

DANBIO styregruppe
Maj 2013

DANBIO

Glostrup Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR
Indgang 5, stuen, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup | Tlf: 3863 3103
Mail: databasen@danbio-online.dk | Web: www.danbio-online.dk