



## PATIENTINFORMATION

# MEDICIN: INFLIXIMAB

### Hvordan anvendes infliximab?

Infliximab anvendes ved behandling af leddegigt (reumatoid artrit), psoriasisgigt, hvirvelsøjlegigt (Mb. Bechterew) og andre svære gigt- og bindevævssygdomme.

### Hvordan virker infliximab?

Infliximab hæmmer det betændelsesfremmende stof TNF- $\alpha$  (tumor necrosis factor  $\alpha$ ), der spiller en central rolle i sygdomsudviklingen. Virkningen består i, at leddenes hævelse, ømhed, stivhed og smerter aftager eller helt forsvinder. Varige skader på leddene påvirkes ikke, men medicinen er i stand til at forsinke eller helt forhindre yderligere ødelæggelse af leddene.

Virkingen af infliximab indtræder efter få uger, og stoffet er virksomt hos mere end halvdelen. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 4 måneder standses behandlingen og erstattes af en anden. Virker infliximab godt, kan behandlingen videreføres i flere år.

### Hvordan gives infliximab?

Infliximab gives i blodåren med drop. Behandlingen gentages 2 og 6 uger efter første dosis, og de efterfølgende behandlinger gives derpå hver 8. uge. De første 4 behandlinger varer hver 2 timer, efterfulgt af 1 times observation. Hvis der ikke har været bivirkninger i forbindelse med de første 4 behandlinger nedsættes behandlingstiden til 1 time.

### Infliximab og anden medicin

Infliximab anvendes sædvanligvis samtidig med methotrexat eller anden immundæmpende medicin. Der er ikke problemer med samtidig indtagelse af anden medicin.

### Bivirkninger ved infliximab

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er infektioner, fx luftvejsinfektioner, blærebetændelse eller hudinfektioner. Infektioner kan udvikles hurtigere med sparsomme symptomer, hvorfor du i tilfælde af feber eller andre tegn på infektion skal kontakte lægen straks.

Bivirkninger relateret til infusionen er almindelige og omfatter lokal hudirritation, feber og kulderystelser samt hudkløe.

Risikoen for eventuelle langtidsbivirkninger er endnu ikke endeligt afklaret. Der har været rejst mistanke om at behandlingen kan medføre øget risiko for udviklingen af visse kræftformer, herunder lymfekræft samt hudkræft. En sådan lille risiko kan ikke udelukkes, men afventer endelig afklaring.



# DANBIO

DANSK REUMATOLOGISK DATABASE

## **Forholdsregler ved planlagte operationer**

På grund af risiko for infektion anbefales, at sidste infliximab-infusion gives 6-8 uger før større operationer. Du skal derfor informere den læge, der står for din behandling om eventuelt planlagte operationer, således at I i fællesskab kan finde frem til den bedst egnede behandling omkring operationstidspunktet.

Behandlingen kan genoptages efter veloverstået operation når evt. sting er fjernet og der ikke er tegn på mangelfuld sårheling eller infektion.

## **Svangerskabsforebyggelse, amning og graviditet**

Både kvinder og mænd, der er i behandling med infliximab skal anvende svangerskabsforebyggende midler. Behandling med infliximab skal ophøre mindst 6 mdr. før planlagt graviditet.

Infliximab bør ikke anvendes under amning

## **Alkohol**

Under behandlingen er der ingen specielle forholdsregler vedrørende indtagelse af alkohol.

## **Kontrol**

Behandlingen fordrer ikke speciel blodprøvekontrol. Af hensyn til anden samtidig medicinsk behandling kontrolleres blodprøver hver 4.-8. uge. I forbindelse med behandlingerne vurderes om infliximab har den ønskede effekt og der udspørges om eventuelle bivirkninger.

DANBIO styregruppe

Maj 2013

### **DANBIO**

Glostrup Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR  
Indgang 5, stuen, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup | Tlf: 3863 3103  
Mail: [databasen@danbio-online.dk](mailto:databasen@danbio-online.dk) | Web: [www.danbio-online.dk](http://www.danbio-online.dk)