

Colchicin

Patientinformation

Anvendelse.

Colchicin anvendes ved behandling af urinsyregigtanfald, men også som forebyggelse mod urinsyregigtanfald. Colchicin kan ligeledes anvendes ved visse sjældnere gigttilstande.

Virkning.

Colchicin virker hæmmende på visse celler i immunapparatet og flere af deres betændelsesreaktioner. Colchicin ændrer ikke urinsyrekoncentrationen i blodet. Colchicin kan således ikke fjerne urinsyreaflejringer i huden.

Hvordan tages Colchicin?

Colchicin indtages som tabletter (0,5 mg), sædvanligvis 2 gange dagligt ved måltid, både når det drejer sig om anfaldsbehandling, og når det drejer sig om forebyggende behandling. Colchicin kan også indgives direkte i blodbanen, hvis andre muligheder er udelukket.

Bivirkninger.

Ovennævnte dosis kan i sjældne tilfælde give anledning til diare. Ved højere dosis ses bivirkninger, og blodprøvekontrol kan være nødvendig. Stor enkelt dosis kan medføre forgiftning – bør opbevares utilgængeligt for børn.

Colchicin og anden medicin.

Ved samtidig indgift af visse former for hjertemedicin (calciumblokkere) bør Colchicindosis nedsættes. Det samme kan være tilfældet ved medicinsk behandling for forhøjet kolesterol.

Colchicin og andre sygdomme.

Ved nyre- og leversygdomme kan det være nødvendigt at nedsætte døgndosis.

Kontrol.

Colchicin kræver ingen fast blodprøvekontrol, ud over ved høj dosis eller ved langtidsbehandling.

Graviditet og amning.

Bør ikke anvendes.

Kirurgiske indgreb.

Colchicin i højdosis kan hæmme helingsprocesser.