

Salagen[®] (pilocarpin)

Patient-information

Salagen anvendes ved Sjögrens sygdom (og visse andre tilstande med tørhed i munden).

Virkning.

Salagen øger signalet i den del af nervesystemet, som fremmer spyt- og tåredannelse. Samtidig stimuleres også svedkirtler samt muskelceller, som omgiver kar og bronkier. Virkningen indtræder gradvist og kan først vurderes sikkert efter 3 måneders brug.

Hvordan tages Salagen?

Salagen indtages som tabletter, gerne i forbindelse med måltid. Den dosis, som lægen har ordineret, skal nøje følges. Glemmes en dosis, skal man ikke tage dobbelt dosis næste gang. Man følger blot den normale dosering. Salagen bør opbevares i den originale emballage, tæt lukket og utilgængeligt for børn.

Bivirkninger.

Stoffets virkningsmekanisme bevirker, at mange vil opleve øget svedtendens. Da huden ved Sjögrens sygdom imidlertid ofte er meget tør, kan dette ligefrem for nogle være en behagelighed. Der kan også forekomme hyppigere vandladning, hvilket dog modvirkes af et mindre behov for at fugte munden og dermed væskeindtagelse, specielt om natten. Enkelte kan opleve allergi i form af udslet. Astma kan forværres. Endelig optræder med mellemrum lettere bivirkninger som hjertebanken, forbigående blodtryksforhøjelse, kulderystelser, hudrødmen og hovedpine.

Kontrol.

Ingen særlig kontrol er nødvendig.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.

Salagen må normalt ikke anvendes under graviditet og amning, da stoffet ikke er undersøgt grundigt under disse omstændigheder. Ved planlagt graviditet stoppes indtagelsen derfor, og den kan først genoptages efter afsluttet ammeperiode.

Salagen og alkohol.

Ingen særlige forholdsregler.

Kirurgiske indgreb.

Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.